

Survey “La vaccinazione anti-Epatite B nei pazienti afferenti ai Centri Dialisi”

Dati Predialisi (CKD V: GFR <15 ml)

D1. Dati riferiti a:

- Centro principale
- Centro principale + CAL (Centro Assistenza Limitata)

D2. Alla presa in carico del paziente in CKD 5° stadio (non in dialisi) da parte del Centro, viene eseguito di routine lo screening per l'epatite B (markers epatite B)?

- In tutti i casi
- Solo all'inizio della dialisi
- Non è eseguito di routine

D3. Quanti pazienti in CKD 5° stadio (non in dialisi) sono seguiti continuativamente dal Centro

- Nessuno
- 01-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- 61-70
- 71-80
- 81-90
- 91-100
- 101-120
- 121-140
- 141-160
- 161-180
- 181-200
- >=201

D4. Quanti pazienti in CKD 5° stadio (non in dialisi) sono vaccinati per l'epatite B

- Nessuno
- 01-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- 61-70
- 71-80
- 81-90
- 91-100
- 101-120
- 121-140
- 141-160

- 161-180
- 181-200
- >=201

D5. Nei pazienti in CKD 5° stadio (non in dialisi) negativi per HbsAg /HBsAb /HbcAb, viene attivato l'iter per la prevenzione dell'epatite B mediante la vaccinazione?

- SI internamente da parte del personale del Centro
- SI da parte del personale dell'ASL di competenza che viene nel Centro
- SI inviando il paziente all'ASL di Competenza
- SI con altra modalità
- NO

D6. Nei pazienti in CKD 5° stadio (non in dialisi) viene verificato il completamento del ciclo vaccinale anti-epatite B?

- Sempre
- Frequentemente
- Raramente
- Mai

D7. Nei pazienti in CKD 5° stadio (non in dialisi) con quale frequenza viene di norma monitorata nel Centro la persistenza dello stato di sieroprotezione?

- Ogni 6 mesi
- Ogni 12 mesi
- Ogni 18 mesi
- Con altra frequenza
- Mai

Dati Dialisi (HD e DP)

D8. Dati riferiti a:

- Centro principale
- Centro principale + CAL (Centro Assistenza Limitata)

D9. Alla presa in carico del paziente in Dialisi (HD+DP) da parte del Centro, viene eseguito di routine lo screening per l'epatite B (markers epatite B)?

- In tutti i casi
- Solo all'inizio della dialisi
- Non è eseguito di routine

D10. Pazienti in Dialisi (HD+DP) seguiti dal Centro

- Nessuno
- 01-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- 61-70
- 71-80
- 81-90

- 91-100
- 101-120
- 121-140
- 141-160
- 161-180
- 181-200
- 201-250
- 251-300
- 301-350
- 351-400
- >= 401

D11. Pazienti in Dialisi (HD+DP) vaccinati per l'epatite B

- Nessuno
- 01-10
- 11-20
- 21-30
- 31-40
- 41-50
- 51-60
- 61-70
- 71-80
- 81-90
- 91-100
- 101-120
- 121-140
- 141-160
- 161-180
- 181-200
- 201-250
- 251-300
- 301-350
- 351-400
- >= 401

D12. Nei pazienti in Dialisi (HD+DP) negativi per HbsAg /HBsAb /HbcAb, viene attivato l'iter per la prevenzione dell'epatite B mediante la vaccinazione?

- SI internamente da parte del personale del Centro
- SI da parte del personale dell'ASL di competenza che viene nel Centro
- SI inviando il paziente all'ASL di Competenza
- SI con altra modalità
- NO

D13. Nei pazienti in Dialisi (HD+DP) viene verificato il completamento del ciclo vaccinale anti-epatite B?

- Sempre
- Frequentemente
- Raramente
- Mai

D14. Nei pazienti in Dialisi (HD+DP) con quale frequenza viene di norma monitorata nel Centro la persistenza dello stato di sieroprotezione?

- Ogni 6 mesi
- Ogni 12 mesi
- Ogni 18 mesi
- Con altra frequenza
- Mai

Caratteristiche ed Opinioni del Compilatore

D15. Qual è il tuo attuale ruolo lavorativo

- Responsabile Struttura Complessa
- Dirigente Medico
- Dottorando
- Specializzando
- Altro ruolo sanitario
- Ruolo non sanitario

D16. In quale tipo di struttura sanitaria lavori attualmente

- Azienda ospedaliera autonoma
- Azienda territoriale (ASL - USL - Area vasta)
- Struttura universitaria o IRCCS
- Struttura privata
- Altro (*specificare*) _____

D17. Ritieni che nel tuo centro sia disponibile l'informazione relativa a quale vaccino anti-epatite sia stato somministrato ai pazienti

- SI
- NO
- NON SO

D18. Ritieni che nel tuo Centro si conosca l'esistenza di un vaccino anti-epatite con un sistema adiuvante specifico per i pazienti con insufficienza renale cronica

- SI
- NO
- NON SO

D19. Per aumentare la formazione del personale sanitario sulla prevenzione dell'epatite B con la vaccinazione, cosa ritieni più utile (1 minimo – 5 massimo):

- Materiale informativo cartaceo
- Materiale informativo online
- FAD sul Counselling
- Collaborare con le associazioni di pazienti in dialisi

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

D20. Per aumentare l'attenzione nei pazienti in predialisi/dialisi sulla prevenzione dell'epatite B con la vaccinazione, cosa ritieni più utile (1 minimo – 5 massimo):

- Materiale informativo cartaceo
- Materiale informativo online
- Attività di Counselling
- Collaborare con le associazioni di pazienti in dialisi

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5